


3月より各地でダニ、アザミウマが多発しています。
特にアザミウマについては、非常に多く大きな被害が出ているハウスもあります。外からの飛び込みが多いので、花をよくチェックして下さい。

4月の管理

病害虫と過熟果に注意しましょう。

- ・温度・・・喚起をしっかり行う。最低気温が5 以上あれば、夜間も開放する。(トチは15 まで開放しない)
- ・灌水・・・少量多灌水を心がけ、昼(11時～14時)に灌水を行う。
紅ほっぺ、トチオトメは灌水が不足すると、裂果、種浮きが発生するので注意する。
- ・液肥・・・1週間に1回



徒長している時は

GPリバーズ 200cc 7日おき2回

- ・遮光・・・4月中旬以降に行う。早いと徒長する。
30%遮光の物が良い。
- ・防除(アザミウマ)・・・マッチ乳 1000倍 スピノエース 5000倍
カスケート乳 4000倍

親株の管理

苗作りは始まっています。

ポイント

手のあいた時にちょこちょこ葉かきや花取りを行うのは絶対に止めましょう。20日に1度、葉かき、花取り等の管理は同時に行います。管理によりクラウンに傷がつくので、管理後は必ず防除して下さい。

ジマンダイセン 600倍
キノドーフ 5~800倍
アントラコール水 500倍
ベルコート水 1000倍
オーソサイド水 800倍

+

豊作 300倍

株全体に、株元にたっぷり散布
・親株の防除には豊作300倍を
展着として混用して下さい。

・追肥

定食後 15 ~ 30日 IB化成 3粒/1株

追肥 20 ~ 30日 ロング90日 20粒/1株

5月下旬 ロング140日 10 ~ 20粒/1株

5月20日には
25cmぐらいの親株に育てる